AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

20-8-69 95 66 60

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

C. C.P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.
2, Rue des Mineurs
67 - STRASBOURG

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

18 août **19**69

Supplément N°2 au bulletin du mois d'août 1969.

/Avertissement/

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Les pluies récentes ont favorisé une reprise très nette de l'activité du champignon et de nouvelles taches vont apparaître incessamment.

La présence de Mildiou étant actuellement observée dans de nombreuses cultures de variétés sensibles, une nouvelle application fongicide ne permettrait plus de maintenir un état sanitaire satisfaisant.

La tubérisation étant à son maximum dans la majorité des cas, nous conseillons d'étendre les opérations de défanage à l'ensemble des parcelles.

Intervenir dès que possible.

Pour le choix des produits se reporter à notre note du 11 août (supplément Nº1 au bulletin du mois d'août).

HOURLON

MILDIOU

La protection des cônes doit être maintenue. Renouveler le traitement dès réception du présent avis-

Nous rappelons que pour éviter la coloration des cônes par les produits cupriques, il est préférable de porter son choix sur des organiques de synthèse.

CULTURES MARAICHERES

Information/

MILDIOU DE LA TOMATE

Maintenir une protection efficace des plantations de tomates de plein air.

49 .../...

Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE - Directeur-Gérant : L. BOUYX

SEPTORIOSE DU CELERI

Cette maladie se manifeste avec une certaine intensité dans les parcelles insuffisamment protégées. Surveiller attentivement l'évolution des taches sur le feuillage et poursuivre les traitements fongicides à un rythme régulier.

(Consulter notre supplément N°3 au bulletin du mois de mai).

Choisir l'un des produits suivants: Produits cupriques : 250 g de Cuivre/hl - Oxyquinoléate de Cuivre : 60 g/hl - Manèbe: 160 g/hl - Mancozèbe: 160 g/hl - Captafol: 160 g/hl - Propinèbe: 210 g/hl - Doguadine: 100 g/hl - Carbatène + Manèbe : 40 g + 120 g/hl.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles :

J. BERNARD et C. GACHON

S CN

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :

J. HARRANGER.